

Tricobac

Prodotto ad azione specifica - Inoculo di funghi micorrizici
consentito in agricoltura biologica

Caratteristiche:

Fertilizzante organico a base di macerato di erbe arricchito con microrganismi utili del terreno quali Batteri della rizosfera (*Bacillus subtilis*, *Bacillus* spp.), Funghi della rizosfera (*Arthrotrichum* spp., *Myrothecium* spp.), *Trichoderma* (*Trichoderma harzianum*), Micorrize (*Glomus* spp.) e estratto di Alghe brune (*Ascophyllum nodosum*). TRICOBAC ricrea una biomassa microbica equilibrata: grazie al suo contenuto di microrganismi utili, ricrea l'equilibrio microbico nel suolo e permette lo sviluppo di funghi e batteri benefici e competitori dei patogeni i quali, rigenerando una popolazione microbica equilibrata, limitando la presenza e l'azione negativa di microrganismi dannosi per le colture, sia sul terreno che sulla vegetazione. E' un prodotto polivalente; grazie alla sua composizione svolge le seguenti funzioni:

- Azione stimolante nei confronti della crescita dei vegetali anche grazie al suo contenuto di sostanze ormonosimili;
- Incremento dell'estensione dell'apparato radicale grazie alla presenza dei funghi micorrizici;
- Aumento della capacità di assorbimento dell'acqua e dei nutrienti da parte delle radici grazie alle micorrize;
- Migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

Modalità e dosi d'impiego:

- Bagno radicale: diluire Tricobac in soluzione al 10% (1 lt su 9 lt) e immergere le radici per alcune ore.
- Concimazione stagionale a terra: 10-20 Lt/Ha; 10-20 mL/Lt; 5 mL/pianta.
- Concimazione fogliare: 1 Lt/HL.

Miscibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ad eccezione di poltiglia bordolese e prodotti a pH alcalino o eccessivamente acido (sotto 5). E' sempre consigliabile eseguire piccoli saggi di miscibilità per verificarne la compatibilità.

Avvertenze:

Non miscelare con prodotti a base di rame e fosetil-Alluminio. Conservare in un luogo fresco, al riparo dalla luce e separato da prodotti di sintesi. Il prodotto deve essere utilizzato entro sei mesi dall'acquisto, dopo tale periodo lo stesso potrebbe ridurre la sua efficacia.

Composizione	Formulazione	Classe tossicità	Intervallo di sicurezza	Confezioni
Contenuto in micorrize 1%, Contenuto in batteri della rizosfera 1×10^7 UFC/g, Contenuto in trichoderma 1×10^7 UFC/g	Liquido	Non pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).	Non necessario	1 litro 5 litri 20 litri 1000 litri